



Få masser af sunde jordbær

Med enkle tiltag kan du undgå de værste sygdomme og skadedyr i jordbærbedet. Husk at forny planterne – juli er et godt tidspunkt. Vand ikke jordbær sidst på dagen, for så stiger risikoen for gråskimmel.

Skåle fyldt med skinnende røde jordbær er noget af det ypperste, vi kan sætte på middagsbordet. Glæden er ikke mindre, når vi selv har dyrket dem. Men fryden kan blive kortvarig, hvis ikke man forny sine jordbær. I mange haver ses planter med næsten dværgagtig vækst. Her er udbyttet små, usle bær uden særlig megen smag.

Løsningen består i at udskifte planterne og sætte nye, men på et andet areal. Jordbærplanter bør ikke vokse mere end tre år på samme plads.

Sidst men ikke mindst skal jordbær have masser af vand. I perioden fra blomstring til plukning skal der vandes i tørre perioder. For at spare på de dyre dråber kan man etablere dryp- / sivevanding. Halv eller andet dækkemateriale mellem rækkerne nedsætter fordampningen og forhindrer, at jord sprøjter op på bærene ved kraftige regnskyl.

SKADEDYR I JORDBÆR

Andre end os mennesker har smag for de populære bær:



JORDBÆRVIKLER er en lille sommerfugl, hvis larve spinder bladene sammen. Når blomsterne dannes, søger larverne herhen, hvor de gnaver i blomsterbunden. Resultatet er ødelagte blomster eller deforme bær. Et svagt angreb kan godt accepteres. Problemet kan løses delvis ved at fjerne blade med larver.



HINDBÆRSNUDEBILLER er ikke kun et problem i hindbær. De voksne snudebiller lægger æg i ikke udspurgne blomsterknopper, der herefter bides i stilken, lige under knoppen. Resultatet er, at knoppen falder af. Et svagt angreb kan accepteres, da der som regel er rigeligt med blomster. Løsningen her er at plante nye jordbær så langt væk fra de gamle som muligt.



JORDBÆRDVÆRGMIDER giver anledning til dværgagtig plantevækst. Disse mikroskopiske mider erkendes som regel kun ved hjælp af symptomerne, som er forkrøblede og gullige nye skud. Resultatet er få og dårligt udviklede jordbær. Løsningen er også her at plante nye og sunde planter på et nyt sted.




ØRESNUDEBILLER kan være et problem i jordbær. De voksne biller laver "billetklip" i bladene, men dét sker der ikke så meget ved. Deres larver derimod kan gnave kraftigt i rødderne, så væksten hæmmes eller værre: planten dør. Her kan løsningen være at udvande nyttige nematoder, der angriber larverne.



TÆGER af forskellige arter kan bide i de små nyudviklede bær og forårsage deformerede bær. Løsningen er igen at sætte nye jordbærplanter så langt væk fra de gamle som muligt.

FUGLE, især solsort, elsker også jordbær. Selv grønne bær er attraktive i tørre perioder. Netdækning er løsningen her, men hold øje med nettet dagligt, så uerfarne fugleunger ikke ender som bifangst.

SVAMPESYGDOMME I JORDBÆR



GRÅSKIMMEL er den mest almindelige svampesygdom i jordbær. Resultatet af et angreb er rådne bær med en grålig belægning. Sporerne findes overalt i luften. Fugtighed i en periode er afgørende for, om sporerne kan spire. Undgå at vande jordbær sidst på dagen. Planterne skal kunne nå at tørre inden natten. Vent med at gøde planterne til efter, at bærrerne er plukket. Afpluk jævnligt rådne bær, så de ikke smitter nabobærerne. Dæk jorden imellem rækkerne med plantemateriale (fx halm), så bær ikke får direkte jordkontakt.



MELDUG ses som røddefarvede, uregelmæssige pletter på bladene. Ved kraftige angreb kan iagttages en hvid belægning på bær og blade. Ofte udvikles meldug, når planterne lider af tørke eller anden stresspåvirkning. Der er stor forskel i sorterens modtagelighed for meldug. Løsning: Vælg sunde sorter, og undgå, at planterne lider af vandmangel.

TAG AFLÆGGERE AF SUNDE PLANTER

På trods af mange mulige forhindringer undervejs kan det sagtens lade sig gøre at blive en habil jordbær dyrker. Juli er et godt tidspunkt at forny sit jordbærbed. Køb nye planter i din plantebutik.

Ser dine egne planter sunde ud, kan du let tage aflæggere, med eller uden rod. Fyld sphagnum i potter, og plant de nye planter her. Efter grundig vanding dækkes med tætsluttende plastik, og planterne placeres på husets nordside, så de ikke steger i solen. Efter 14 dage er de klar til udplantning.

Læs mere om skadedyr og plantesygdomme i jordbær på www.plante-doktor.dk.